

Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается подъем заболеваемости населения ГЛПС, который связан с массовой миграцией грызунов в населенные пункты и их расселением по жилым домам. В целях стабилизации заболеваемости ГЛПС, предупреждения групповых случаев и летальных исходов среди жителей Республики Марий Эл распространяется памятка по профилактике ГЛПС



Профилактика ГЛПС

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание, с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека.

Заболевание широко распространено в Республике Марий Эл благодаря высокой численности носителей вируса ГЛПС в природе – лесных грызунов, в особенности рыжей полевки. Вирус ГЛПС попадает во внешнюю среду с выделениями зараженных зверьков.

Пути передачи инфекции:

- **Воздушно-пылевой** (до 85 %), при котором пыль, содержащая высохшие выделения грызунов, а, следовательно, и вирус, попадает при дыхании в организм человека;
- **Контактно- бытовой** – курение и прием пищи грязными руками или непосредственной контакт со зверьками;
- **Алиментарный** – употребление без термической обработки в пищу продуктов питания, которые загрязнены выделениями грызунов, имею следы погрызов.

Заболевание от человека к человеку не передается!

Когда происходит заражение человека ГЛПС:

- При посещении леса, отдыхе на природе;
- При постоянной работе в лесу;
- Во время сельскохозяйственных работ;
- При работе, уборке на дачных участках (обычно весной и осенью);

Как проявляется ГЛПС?

С момента заражения до появления первых заболевания проходит 7-10 дней. Начало заболевания похоже на обычную острую респираторную инфекцию: повышается температура, появляется головная боль, слабость, мышцах, общая слабость, потеря аппетита, иногда рвота. На 4-5 день к перечисленным симптомам присоединяются боли в пояснице и животе, иногда появляется сыпь. Нарушается функция почек, жажда, сухость во рту, икота. Возникают кровотечения: почечные, желудочные, носовые и др.

ПОМНИТЕ: вакцины или специфическая иммуноглобулина против ГЛПС не существует!

При любых проявлениях заболевания необходимо быстрее обратиться в поликлинику по месту жительства. Лечение проводится только в стационаре, самолечение опасно!

В целях профилактики ГЛПС:

- Во время работы при большом количестве грызунов необходимо использовать рукавицы и респиратор и марлевую повязку, уборка помещений должна проводиться только влажным способом;
- Продукты должны быть недоступными для грызунов, храниться в герметичной таре, поврежденные пищевые продукты нельзя использовать в пищу;
- Строго запрещается курить и принимать пищу немытыми руками;
- Обработку от грызунов (дератизацию) рекомендуется проводить не реже 2 раз в год, особенно в период массовой миграции грызунов в жилые и производственные помещения: в апреле-мае и в сентябре-октябре.

